

DIABÈTE : COMPLICATIONS AIGUËS AUTRES COMPLICATIONS AIGUËS

Il y a d'autres complications aiguës du diabète (en plus des hypoglycémies), plus graves et qui demandent des soins urgents. Il s'agit de décompensations qui se manifestent de différentes manières.

Ces complications peuvent apparaître chez les diabétiques déclarés alors qu'ils avaient moins de 30 ans et qui ont eu besoin d'insuline dès le début. Elles se manifestent par les symptômes suivants:

- peau sèche et chaude (signe de déshydratation),
- respiration rapide et profonde,
- désorientation et somnolence,
- odeur de pomme,
- nausées ou vomissements,
- douleur abdominale,
- glycémie capillaire (sucre dans le doigt) supérieure à 300 mg/dl.

Ces complications apparaissent également chez les diabétiques déclarés à partir de 30-40 ans, généralement obèses, et surtout chez les patients âgés de plus de 50 ans. Elles peuvent également concerner des personnes pour lesquelles le diabète n'a pas encore été diagnostiqué, mais qui sont atteintes d'une maladie qui le déclenche, et chez qui on observe:

- Peau très sèche (très déshydratée),
- Glycémie capillaire très élevée (l'appareil ne peut pas la détecter et aucun chiffre n'apparaît à l'écran, simplement le mot **HIGH, ÉLEVÉE** en anglais).
- Désorientation et parfois perte de connaissance.

Les deux situations donnent l'impression d'être graves et induisent à réclamer des soins urgents.

