

糖尿病：严重并发症 其它的严重并发症

还存在糖尿病的其它更严重的并发症(除低血糖之外)，需要急诊治疗。这是指由其它方式表现出来的代偿失调。

这些并发症可以在那些30岁年龄之前就开始病史的糖尿病患者中出现，从一开始就需要胰岛素，而且以以下的症状表现出来：

- 皮肤干燥且温度高(由于脱水)。
- 急促和深沉的呼吸。
- 头晕和肢体麻木。
- 闻东西时有苹果味。
- 恶心或呕吐。
- 腹部疼痛。
- 毛细血管葡萄糖含量(手指的血糖)高于 300mg/dl。

也可以在30-40岁开始被诊断出糖尿病的病人中发现这些并发症，他们大部分具有肥胖症，尤其是50岁以上的病人。有时候病人还未被诊断出糖尿病，而是联系到其它的某种疾病而由此爆发这些并发症，现象如下：

- 皮肤非常干燥(严重脱水)。
- 毛细血管葡萄糖指数非常高(测此指数的仪器已不能在屏幕上表示数值，而以英语单词 HIGH(“高”的意思)来表示)。
- 头晕，有时会不省人事。

以上两类并发症给以严重病情的印象，需要赴急诊治疗。

