
Principios generales a valorar en la decisión terapéutica

Grupo de Trabajo semFYC


semFYC
Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria



Manejo de la hiperglucemia con fármacos no insulínicos en pacientes adultos con diabetes tipo 2. Grupo de Diabetes de la Sociedad Española de Medicina de Familia (semFYC). Atención Primaria 2019 en prensa)

ALGORITMO PARA LA COMBINACIÓN DE FÁRMACOS NO INSULÍNICOS

2019



Si HbA1c>9% iniciar con terapia combinada con Metformina más otro agente.
Si síntomas cardinales (pérdida de peso, cetonuria) o precisa mas de 3 fármacos, iniciar insulinización.
(*) En pacientes respondedores, valorar 3-6 meses solo con medidas no farmacológicas
(**) En España el uso financiado está restringido a pacientes con obesidad

iDPP4= Inhibidores de Dipeptidil Peptidasa 4 (gliptinas);
iSGLT2= Inhibidores del cotransportador Sodio Glucosa 2 (glucosúricos); arGLP1= Agonistas del receptor del GLP1.



MTF= Metformina; iSGLT2= Inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 ; iDPP4= Inhibidores de la dipeptidilpeptidasa tipo 4 ; arGLP1= Agonistas del receptor de glucagon-like peptide-1; PIO= Pioglitazona. HGNA: Hígado Graso No Alcohólico. FG =Filtrado Glomerular (ml/min/1,73m2) IC= Insuficiencia cardiaca.

semFYC
Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria

Grupo de Trabajo semFYC

FARMACOS EN ENFERMEDAD RENAL

Dosis máximas /día

2019 semFYC Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria

FG (ml/min/ /1,73m2)	Met formina	Empa gliflozina	Cana gliflozina	Dapa gliflozina	Sita gliptina	Lina gliptina	Vilda gliptina	Saxa gliptina	Alo gliptina
≥ 60									
59-50		No recomendado iniciar tratamiento							
49-45	2 g/d	10 mg/d	100 mg/d		50 mg/d		50 mg/d		12.5 mg/d
44-30	1 g/d				50 mg/d			2.5 mg/d	
29-15					25 mg/d				6.25 mg/d
<15									

FG (ml/min/ /1,73m2)	Lira glutida	Dula glutida	Sema glutida	Lixi senatida	Exe natida	Exenatida -Lar	Albiglutida	Piogli tazona	Glicla zida	Repa glinida
≥ 60										
59-50										
49-45										
44-30										
29-15								15 mg/d		
<15										

Permitido SIN ajuste de dosis Permitido CON ajuste de dosis No recomendado

Grupo de Trabajo semFYC