

DIABETES: AKUTE KOMPLIKATIONEN SONSTIGE AKUTE KOMPLIKATIONEN

Neben der Hypoglykämie gibt es noch andere, weitaus ernstere akute Komplikationen der Diabetes, die eine dringende ärztliche Behandlung erforderlich machen. Es handelt sich um Dekompensationen, die sich auf verschiedene Weise äußern.

Diese Komplikationen können bei Personen auftreten, deren Diabetes in jungem Alter (unter 30 Jahren) begonnen hat und die von Beginn an Insulin benötigen und zeigen sich durch folgende Symptome:

- Trockene und heiße Haut (Flüssigkeitsmangel)
- Rasche und tiefe Atmung
- Orientierungslosigkeit und Schläfrigkeit
- Apfelgeruch
- Übelkeit oder Erbrechen
- Bauchschmerzen
- kapillarer Blutzuckerspiegel (Fingereinstich) über 300 mg/dl.

Auch bei Diabetikern, deren Krankheit im Alter zwischen 30-40 Jahren festgestellt wurde, können diese Komplikationen auftreten, vor allem bei stark übergewichtigen Personen über 50 Jahren. Manchmal wurde bei diesen Personen noch kein Diabetes festgestellt, und dieser erst von einer anderen Krankheit ausgelöst. Dabei sind folgende Symptome zu beobachten:

- Sehr trockene Haut (hoher Flüssigkeitsmangel)
- Sehr hoher Blutzuckerspiegel (das Messgerät kann ihn nicht mehr messen, sodass anstatt von Zahlen das englische Wort **HIGH** – für HOCH – angezeigt wird).
- Orientierungslosigkeit und manchmal Bewusstlosigkeit



Beide Erscheinungsbilder sind sehr ernst zu nehmen und weisen auf die Notwendigkeit dringender ärztlicher Behandlung hin.