

توعية حول مرض السكري

أدوية عن طريق الفم.

لماذا يجب تناول الحبوب من أجل ضبط مرض السكري.

ينشأ مرض السكري من النوع 2 حين لا يتمكن الأنسولين من جعل الغلوكوز يتسرب إلى الأنسجة، أو بسبب أن كمية الأنسولين غير كافية. هناك أدوية من أجل معالجة كلا الحالتين.

عدم نسيان أن مرض السكري غير ملحوظ، وإن شعر المريض بأنه على يرام، فيجب أن يتناول الأدوية.

كل دواء يختلف عن الآخر.

يجب على المريض أن يتناول الدواء حسب ما حدده له الطبيب المشرف، وإلا فإنه سيتعرض للخطر. يجب عدم استبدال الدواء أو تناول دواء يعود لشخص آخر.



بعض الأدوية تزعج المريض.

هناك بعض الأدوية الخاصة بعلاج مرض السكري التي قد تسبب هبوطاً مفاجئاً للسكر (انخفاض نسبة السكر). إن الأعراض المتعارف عليها هي حدوث تشوش في الرؤية، ارتجاف، تعرق، دوار، صداع، تسرع في النبض، تشتت (لا يدري المريض أين هو أو ما الذي يفعله). إذا شعر المريض بأي من الأعراض السابقة ولم يكن قادراً على وخز إصبعه لمعرفة نسبة السكر في تلك اللحظة، فعليه تناول شيئاً من السكر وأن يراجع طبيبه المشرف. إذا وجد أن بعض الأدوية تزعجه أو يشعر بشيء غريب، فعليه أن يستشير الطبيب المشرف دون أو يوقف تناولها من تلقاء نفسه.

حبوب كثيرة.

قد تتطلب درجة مرض السكري لدى الشخص أن يتناول حبوباً كثيرة يومياً. يجب عليه أن لا يتوقف عن تناولها دون استشارة الطبيب المشرف.