

MÉDICAMENTS PAR VOIE ORALE

Pourquoi êtes-vous obligé de prendre des cachets pour contrôler le diabète?

Le diabète de type 2 est dû au fait que votre insuline n'arrive pas à faire passer le glucose dans les tissus ou que la quantité d'insuline produite est insuffisante. Il existe des médicaments pour traiter les deux problèmes.

N'oubliez pas que le diabète ne se manifeste pas par des symptômes et, même si vous vous sentez en forme, vous devez prendre vos médicaments.



Chaque médicament est différent

Prenez le médicament comme il vous a été prescrit par le personnel médical, faute de quoi cela pourrait être dangereux. Ne les changez jamais, ni ne prenez ceux d'autres personnes.

Et si les cachets ont des effets indésirables?

Certains cachets contre le diabète peuvent provoquer une baisse trop importante de sucre (hypoglycémie). Les symptômes les plus fréquents sont: troubles de vision, tremblements, sueurs, étourdissements, faim, maux de tête, palpitations, confusion (ne pas savoir où l'on se trouve ou ce que l'on est en train de faire).

Si vous ressentez quelque chose de semblable et n'arrivez pas à vous piquer le doigt pour contrôler

le sucre à l'instant,

prenez du sucre et faites appel à votre médecin traitant ou au personnel d'infirmier.

Si vous pensez que certains cachets ne vous conviennent pas ou si vous avez des sensations bizarres, parlez-en à votre médecin traitant ou au personnel d'infirmier mais n'arrêtez jamais le traitement sans consulter.

Cela fait beaucoup de cachets à avaler...

Avec l'évolution du diabète, il est possible que vous soyez obligé de prendre beaucoup de cachets chaque jour. Ne les arrêtez jamais sans consulter votre médecin ou le personnel d'infirmier.

