

MEDICAMENTE ORALE

De ce sa luam pastile pentru a controla diabetul?

Diabetul de tip 2 se produce pentru ca insulina nu poate sa faca ca glucoza sa intre în tesuturi sau pentru ca organismul nu fabrica suficienta insulina. De aceea exista medicamente care sa solutioneze aceste probleme.

Nu uitati ca diabetul nu se simte si chiar daca va simtiti bine, trebuie sa luati medicamentele



Fiecare medicament este diferit

Luati medicamentul asa cum v-a recomandat medicul sau asistenta, altfel ar putea fi periculos. Nu schimbati si nu luati niciodata medicamentele altor persoane.

Daca medicamentele va dau o stare de disconfort?

Unele pastile folosite în tratamentul diabetului pot produce uneori o scadere excesiva a zharului (hipoglicemie). Simptomele cele mai frecvente sunt cele de viziune cetoasa, tremuraturi, transpiratie, stare de greata, foame, durere de cap, palpitatii, stare de confuzie (nu stie unde se afla sau ce face). Daca notati ceva asemanator si nu puteti sa va faceti proba capilara

(în deget) pentru a vedea nivelul zaharului, luati un pic de zahar si mergeti la doctor sau asistenta.

Daca aveti impresia ca anumite pastile va dau o stare de disconfort sau simtiti ceva neobisnuit, consultati doctorul sau asistenta, dar nu întrerupeti tratamentul.

Sunt pera multe pastile...

Este posibil ca în functie de evolutia diabetului sa trebuiasca sa luati mai multe pastile pe zi ce trece. Nu întrerupeti luarea pastilelor fara a fi consultat în prealabil medicul/asistenta.

