

ОРАЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Почему необходимо принимать таблетки при лечении диабета?

Диабет 2-го типа возникает из-за того, что инсулин не позволяет глюкозе проникать в ткани, или потому, что инсулина вырабатывается недостаточно. Для устранения обеих проблем существуют лекарства.

Помните, что диабет не дает о себе знать, и хотя вы чувствуете себя хорошо, необходимо принимать лекарства.



Все лекарства разные

Принимайте лекарство так, как вам назначил врач или фельдшер, иначе ваше здоровье может оказаться в опасности. Никогда сами не меняйте лекарство и не принимайте то, что назначено другим больным.

Если таблетки не помогают

Некоторые таблетки для лечения диабета могут иногда вызывать излишнее понижение уровня сахара в крови (гипогликемию). Наиболее частыми симптомами являются: помутнение зрения, дрожь, испарина, головокружение, чувство голода, головная боль, сердцебиение, помрачение сознания (человек не понимает, где находится и что делает). Если вы почувствовали какой-либо из этих симптомов, но в это время не можете сделать анализ крови на сахар, съешьте что-нибудь сладкое и

обратитесь к врачу или фельдшеру.

Если вы считаете, что таблетки идут вам во вред, или замечаете что-то странное, посоветуйтесь с врачом или фельдшером, но не прекращайте лечение без консультации.

Таблеток много разных...

Не исключено, что в зависимости от развития диабета вам придется ежедневно принимать много таблеток. Не прекращайте принимать лекарства без консультации врача или фельдшера.

