Fundación redGDPS
Comprometidos con la DIABETES

DIAGNÓSTICO DE DIABETES TIPO 2

Pruebas diagnósticas

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
HbA_{1c}	**≥6,5%**
Glucemia Basal	**≥ 126** mg/dl
Sobrecarga Oral de Glucosa (2h tras 75g de glucosa oral)	**≥ 200** mg/dl
Glucemia al azar	**≥ 200** mg/dl

Elección de prueba diagnóstica

Todas pruebas tienen el mismo valor diagnóstico.

Confirmación de diagnóstico

- Para confirmar el diagnóstico es preciso dos pruebas diagnósticas anormales en la misma o en diferentes analíticas (HbA1c / GB / SOG).
- Exceptuando clínica de hiperglucemia, en la que se podría confirmar con una glucemia al azar ≥200 mg/dl.

Posibles alteraciones de la hemoglobina glicada

En las siguientes patologías se puede ver alterado el resultado de la HbA1c por lo que nos guiaremos por criterios glucémicos:

- **Deficiencia de la 6-glucosa-fosfato-deshidrogenasa.**
- **Hemodiálisis y terapia con eritropoyetina.**
- **Síndrome de inmunodeficiencia adquirida** (SIDA).
- **Embarazo** (segundo y tercer trimestre, y postparto).
- **Anemia de células falciformes.**

https://care.diabetesjournals.org/content/44/Supplement_1
American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes–2021, Diabetes Care Volume 44, Supplement 1, January 2020: 1-226